

العلاج الفسيولوجي المتعدد الوسائط قصير المدى لعلاج الفولفودينيا

الهدف

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فعالية العلاج الفسيولوجي المتعدد الوسائط قصير المدى لدى النساء المصابات بالفولفودينيا المستتارة.

النتائج

أظهر العلاج الفسيولوجي المتعدد الوسائط قصير المدى، الذي شمل ليدوكائين، كابيسيدين، وتحفيز الأعصاب قدرة على تخفيف الألم بسرعة لدى النساء المصابات بالفولفودينيا المستتارة. كما، (TENS) الكهربائي عبر الجلد أدى إلى تحسن معتدل إلى كبير في التجارب الجنسية، مع استمرار فعاليته على المدى الطويل. كما سجل العلاج مستويات عالية من التحمل والسلامة.

المشاركون والباحثون

تم تشخيص عشر نساء مصابات بالفولفودينيا المستتارة أو العفوية، وكان متوسط أعمارهن 34.1 سنة (نطاق: 25-50 سنة).

الباحثون المشاركون في الدراسة:

- كاوهسيونغ، تايوان، كلية الدراسات العليا للصحة الجنسية، جامعة RR Tao
- للطب الجنسي، تايوان Ching-Yuan مركز YJ Chou

المنهجية

تم إدراج النساء المصابات بالفولفودينيا غير المحتملة في الدراسة، حيث تم إجراء فحوصات طبية شملت اختبار المسحة القطنية والفحص الحوضي من قبل طبيب أمراض نسائية واحد.

تم علاج المشاركات أثناء الاستلقاء بوضعية الأرجل المتشابكة بمعدل جلسة واحدة كل 1-2 أسبوع حتى تحقق تخفيف الألم بالكامل.

تضمن العلاج نهجًا متعدد الوسائط يشمل:

1. جل الليدوكائين
2. جل الكابيسيدين
3. NeuroTrac TENS لمدة 30 دقيقة، باستخدام جهاز (TENS) تحفيز الأعصاب الكهربائي عبر الجلد (Verity Medical) ثنائي القناة.

بعد إكمال العلاج، تمت متابعة جميع المشاركات لمدة 3-6 أشهر لتقييم:

- الفعالية
- خلال 4 أسابيع (SSE) التجارب الجنسية المرضية
- الآثار الجانبية
- حدوث انتكاسات

يمكن العثور على الملخص الكامل عبر الرابط:

<https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2022.03.517>.